


**Sprawdź
swoją
wiedzę**







1. Zwykle po upływie półtorej godziny mężczyzna ważący 75 kilogramów, który wypił jedno półlitrowe piwo, nie będzie już miał alkoholu we krwi.

PRAWDA

FAŁSZ

2. W Polsce nie pije alkoholu jedynie co dziesiąta dorosła osoba.

PRAWDA

FAŁSZ

3. Kobiety, po wypiciu tej samej ilości alkoholu co mężczyźni, mogą mieć jego stężenie we krwi nawet dwa razy wyższe

PRAWDA


FAŁSZ

4. Test AUDIT służy do obliczania orientacyjnej zawartości alkoholu we krwi

PRAWDA

FAŁSZ





5. W polskim prawie zawartość alkoholu we krwi powyżej 0,5‰ (promila) określana jest jako „stan po spożyciu alkoholu”

PRAWDA

FAŁSZ

6. Od 2 do 3‰ alkoholu we krwi ma kobieta która wypła około 12 lampek wina

PRAWDA

FAŁSZ

7. W przypadku zawartości we krwi alkoholu powyżej 3‰ mogą pojawić się trudności z oddychaniem

PRAWDA

FAŁSZ

8. Pijąc alkohol i przyjmując leki przeciwbólowe na bazie paracetamolu ryzykuje się nieodwracalnym uszkodzeniem wątroby

PRAWDA

FAŁSZ

9. Będąc sprawcą jakiegoś wypadku pod wpływem alkoholu ponosi się takie same konsekwencje jak będąc trzeźwym

PRAWDA

FAŁSZ

10. „Alkoholowe Liczydełko” służy do obliczania wydatków ponoszonych na zakup alkoholu

PRAWDA

FAŁSZ



ODPOWIEDZI

Pytanie	Poprawna odpowiedź
1	Fałsz
2	Fałsz
3	Prawda
4	Fałsz
5	Fałsz
6	Prawda
7	Prawda
8	Prawda
9	Fałsz
10	Fałsz

